



RestoraLAX®

| Info-médicament | |
|--|---------------------------|
| Ingrédient actif (p/p) 100 % de polyéthylèneglycol 3350..... | Utilité Laxatif |
| Usages • Soulage la constipation occasionnelle et l'irrégularité. • Entraîne généralement un mouvement intestinal en 1 à 3 jours. | |
| Mises en garde | |
| Alerte aux allergies Ne pas utiliser en cas d'allergie au polyéthylèneglycol. Ne pas utiliser • en présence d'obstruction intestinale connue ou suspectée • en cas d'une maladie rénale, à moins d'avis contraire et de supervision d'un médecin. | |
| Consultez un médecin ou un pharmacien avant l'utilisation si vous • présentez ▪ des symptômes laissant croire à une obstruction intestinale, une appendicite ou une inflammation des intestins (fièvre, nausée, vomissements, douleur abdominale ou ballonnement) ▪ un trouble médical • ou si vous ▪ êtes enceinte ou allaitez ▪ prévoyez concevoir • prenez un épaississant alimentaire à base d'amidon en raison de difficulté à avaler. RestoraLAX pourrait réduire l'effet épaississant de ce produit et augmenter ainsi le risque d'étouffement. | |
| Lorsque vous utilisez ce produit • Peut entraîner des selles molles, liquides ou plus fréquentes. • Peut causer des nausées, des ballonnements abdominaux, des crampes ou des flatulences, de la diarrhée et des selles excessives plus fréquentes. Si ces symptômes sont graves, cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin. • Ne prenez pas 2 heures avant ou après un autre médicament, car les effets souhaités de cet autre medicament pourraient en être réduits. • Une surutilisation ou une utilisation prolongée de laxatif peut entraîner une accoutumance de la fonction intestinale. | |
| Cessez d'utiliser ce produit et consultez un médecin si • vous avez des saignements rectaux • il y a une aggravation du ballonnement, des crampes, des nausées ou des douleurs abdominales • vous avez la diarrhée, surtout chez les personnes âgées • il y a une persistance ou aggravation des symptômes • vous avez une réaction allergique (p. ex. éruptions cutanées, enflure, difficulté à respirer). | |
| Garder hors de la portée des enfants. En cas de surdosage, cesser d'utiliser ce médicament, boire de l'eau et appeler un centre antipoison ou obtenir de l'aide médicale immédiatement. | |
| Mode d'emploi • Le flacon est muni d'un bouchon-doseur. Remplir le bouchon-doseur jusqu'en haut de la partie blanche indiquant la dose à prendre (17 g). • Adultes (> 18 ans): Prendre une dose (17 g) par jour. Mélanger et dissoudre dans 8 onces (250 mL) de boisson non alcoolisée (froide, chaude ou à température ambiante), puis boire le tout. Il faut que la poudre soit complètement dissoute avant de boire le mélange. Ne pas boire s'il y a des grumeaux. RestoraLAX® se dissout facilement et complètement dans des boissons courantes comme de l'eau, du jus, du café ou du thé. • Ne pas prendre plus que la dose indiquée, à moins d'avis contraire d'un médecin. • L'innocuité et l'efficacité de RestoraLAX® chez les enfants de moins de 18 ans n'ont pas été établies. Enfants de 18 ans et moins: consulter un médecin. • Ne pas utiliser pendant plus de 7 jours, sauf sur l'avis d'un médecin. | |
| Autres renseignements • Conserver entre 15 et 30 °C. • Sceau de sécurité: N'utiliser que si la pellicule d'aluminium sous le bouchon est intacte. | |
| Ingrédient inactif aucun | |
| Questions? 1-800-265-7382 | |